



Eulemur fulvus




Cette espèce (**Brown Lemur**) a été décrite pour la première fois par E. Geoffroy en 1796.



Eulemur fulvus est le plus répandu de tous les **Eulemur**. Cette espèce est divisée en sept sous-espèces ; les aires de répartition de chacune étant apparemment distinctes:

- *Eulemur fulvus albifrons* dans la forêt tropicale humide du Nord-Est
- *Eulemur fulvus albocollaris* au Sud-Est
- *Eulemur fulvus collaris* dans le Sud-Est
- *Eulemur fulvus fulvus* au Nord-Ouest
- *Eulemur fulvus mayottensis* dans les Comores
- *Eulemur fulvus rufus* dans la partie orientale et la partie occidentale de Madagascar, ainsi que dans la **Réserve Privée de Berenty**
- *Eulemur fulvus sanfordi* dans une zone très limitée au Nord




Eulemur fulvus se trouve dans tous les types de forêts natives, à l'exception des régions de forêts arides d'épineux situées dans la région Sud et Sud-Ouest de Madagascar. On trouve également des animaux de cette espèce dans les **Comores**. C'est une espèce qui peut survivre dans des végétations de type secondaire et qui s'adapte bien au milieu dans lequel elle se trouve.

Toutes les sous-espèces sont constituées d'animaux de taille moyenne, vivant en groupes de taille et de composition variables, et dont le régime alimentaire se compose principalement de fruits, de feuilles, de fleurs et de jus de plantes. Ces

animaux possèdent un riche répertoire vocal. Ils ont une vision binoculaire et possèdent des glandes de marquage sur les poignets.

Tous les *Eulemur fulvus* sont des animaux de la taille d'un chat domestique et sont actifs aussi bien le jour que la nuit. L'activité nocturne varie de manière saisonnière et est fonction à la fois de la disponibilité en ressources alimentaires et du cycle lunaire.



La sous-espèce *Eulemur fulvus mayottensis* a été formée avec des individus présents sur l'île de **Mayotte**, dans les **Comores** et il est très probable que ces animaux ont été introduits par l'homme il y a quelques centaines d'années.



L'espèce **Eulemur** est la troisième espèce la plus commune en captivité, après *Lemur catta* et *Varecia variegata*. Si les conditions sont bonnes ces animaux se reproduisent bien en captivité.

Les noms communs suivants ont été utilisés pour *Eulemur fulvus* :

Varika 🇲🇵

Varikamavo 🇲🇵

Varikamavo 🇲🇵

Brown Lemur 🇺🇸

Fulvous Lemur 🇺🇸

Lémur brun 🇫🇷

Brauenmaki 🇩🇪

Zwartkopmaki 🇳🇱