

# Propithecus diadema candidus

## Noms communs

Simpomalandy 🇷🇺

Simpona 🇷🇺

Simpony 🇷🇺

Silky Simpona 🇺🇸

Silky Sifaka 🇺🇸

Propithèque soyeux 🇫🇷

Scidendiadeemsifaka 🇩🇪

Zijde Diadeemsifaka 🇳🇱

## Description



Cette sous-espèce (**Silky Sifaka**) a été décrite pour la première fois en 1871 par A. Grandidier.

Le pelage est dense, long, soyeux et a une coloration uniforme blanc crème. Quelques individus ont des tons argentés autour de la couronne, sur le dos et les membres. La face est nue, de couleur gris-ardoise noir et les yeux sont rouge-orange.

Le synonyme suivant a été utilisé pour *Propithecus diadema candidus* :

*Propithecus sericeus* (Milne-Edwards et Grandidier, 1872)



## Identification

***Propithecus diadema candidus*** est un Lemur de grande taille se déplaçant le long des troncs d'arbres ou par des sauts.

Du fait de sa coloration entièrement blanche cette sous-espèce ne peut être confondue avec aucun autre Lemur présent dans son aire de répartition.



## Mensurations

Longueur totale : 93 à 105 cm

Tête et corps : 48 à 54 cm

Queue : 45 à 51 cm

Poids : 5,0 à 6,0 kg



## Habitat

***Propithecus diadema candidus*** se rencontre dans des forêts tropicales humides de moyenne altitude et de montagne. Les animaux se trouvent de préférence entre 800 et 1 500 mètres d'altitude.



## Populations

Aucune estimation de la population globale de ***Propithecus diadema candidus*** n'a été effectuée.

Dans le **Massif de Marojejy** la densité de population a été estimée à 8 ou 10 individus par kilomètre carré.

## Comportement

La taille des groupes de *Propithecus diadema candidus* semble varier de trois à sept individus, ce ne sont pas forcément des groupes familiaux, au moins en ce qui concerne les plus grands. Dans un groupe tous les petits ont la même taille car ils sont tous nés en même temps.

Le territoire d'un groupe semble être assez grand et sa délimitation s'effectue par des marquages olfactifs.

## Reproduction

Les petits de *Propithecus diadema candidus* naissent sans doute vers le mois d'Août.

## Distribution

*Propithecus diadema candidus* se trouve à l'extrémité Nord de la ceinture de forêt tropicale humide orientale. Son aire de répartition va de la rivière **Antainambalana**, près de **Maroantsetra** (au Sud), jusqu'au **Massif de Marojejy** (au Nord) ; elle ne semble pas recouvrir la **Péninsule de Masoala**.

## Observations



*Propithecus diadema candidus* est un animal difficile à observer. Le meilleur site pour cette observation est la **Forêt de Befingitra** dans la **Réserve spéciale d'Anjanaharibe Sud**.

Un autre site d'observation se trouve près de la ville de **Doany**, sur le bord occidental du **Parc National de Marojejy**.



## Menaces

La destruction de la forêt est l'une des principales menaces pesant sur *Propithecus diadema candidus*.

En particulier dans le **Massif de Marojejy** et le secteur d'**Andapa** cette sous-espèce est chassée pour l'alimentation humaine.



## IUCN

En 1996 : **en danger critique (A2cd, B1 + 2bc)**



## Conservation

*Propithecus diadema candidus* est présent dans deux Aires Protégées: le **Parc National de Marojejy**; la **Réserve Spéciale d'Anjanaharibe Sud**.