

# Propithecus diadema diadema

## Noms communs

Simpona 🇷🇺

Simpony 🇷🇺

Diademed Sifaka 🇺🇸

Diademed Simpona 🇺🇸

Propithèque à diadème 🇫🇷

Vliessmaki 🇩🇪

Diadeemsifaka 🇳🇱

## Description



Cette sous-espèce (**Diademed Sifaka**) a été décrite pour la première fois en 1832 par Bennett.

Le pelage est soyeux et modérément long. La tête est en majeure partie blanche avec une couronne noire pouvant s'étendre jusqu'au bas de la nuque. La face est nue, de couleur gris sombre à noir et les yeux sont brun-rouge. Les épaules et le dos ont une coloration de gris-ardoise à gris argenté. Le ventre et la queue sont gris pâle à blanc, avec souvent un anneau jaune d'or à la base. Les membres sont orange et jaune d'or, les mains et les pieds sont noirs. La poitrine est blanc cassé à gris pâle.

## Identification

***Propithecus diadema diadema*** est un Lemur de grande taille dont les déplacements s'effectuent soit en position verticale le long des troncs, soit par des sauts.

Les animaux de cette sous-espèce sont les plus grands de tous les Lemurs vivant actuellement, avec *Indri indri*, espèce avec laquelle *Propithecus diadema diadema* est en sympatrie dans la plupart des zones de son aire de répartition. Toutefois il ne doit y avoir aucune confusion entre les deux animaux.

## Mensurations


Longueur totale : 94 à 105 cm

Tête et corps : 50 à 55 cm

Queue : 44 à 50 cm

Poids : 6,0 à 7,25 kg

## Habitat



*Propithecus diadema diadema* se rencontre dans des forêts tropicales humides de moyenne altitude, de préférence au dessus de 800 mètres.

## Populations

Il n'existe aucune évaluation de la population globale de *Propithecus diadema diadema*, mais les densités de population doivent être assez faibles.

## Alimentation

Le régime alimentaire de *Propithecus diadema diadema* est surtout constitué de feuilles, de fleurs et de fruits. Plus de 25 espèces différentes de plantes sont utilisées quotidiennement.

## Comportement



*Propithecus diadema diadema* est une espèce diurne vivant en groupes pouvant comporter jusqu'à six animaux, avec plusieurs mâles et plusieurs femelles. Les mâles peuvent aller d'un groupe à un autre, tandis que les femelles restent toujours dans le même groupe.


Le territoire d'un groupe peut s'étendre jusqu'à 35 hectares et il est principalement délimité par des marquages olfactifs.

La plupart des déplacements se font dans les arbres, mais les animaux peuvent parfois évoluer au sol.

## Reproduction

La femelle de *Propithecus diadema diadema* donne naissance à un unique petit par portée.

## Distribution



*Propithecus diadema diadema* est confiné aux forêts tropicales humides de l'Est et du Nord-Est de Madagascar. C'est la sous-espèce la plus largement distribuée de tous les *Propithecus diadema*.

L'aire de répartition de cette sous-espèce irait de la rivière **Mangoro** (au Sud) à la rivière **Antainambalana** (au Nord).

## Observations



*Propithecus diadema diadema* est l'une des espèces de Lemur les plus difficiles à observer.

La **Réserve Spéciale d'Analamazaotra**, près d'**Andasibe**, a été un bon site d'observation, mais il semble maintenant que le **Parc National de Mantadia** offre les meilleures possibilités.

## Menaces

Les petits en bas âge, de même que les jeunes peuvent être attaqués par *Cryptoprocta ferox*, *Polyboroides radiatus* et *Accipiter henstii*.

La destruction des forêts est également une menace pesant sur cette sous-espèce.

Dans de nombreux secteurs de son aire de répartition *Propithecus diadema diadema* est chassé pour l'alimentation humaine.

## IUCN

En 1996 : **en danger (A1cd)**

## Conservation

Cette sous-espèce est présente dans sept Aires Protégées: les Parcs Nationaux de **Mantadia**, de **Zahamena**; les Réserves Naturelles Intégrales de **Betampona**, de **Zahamena**; les Réserves Spéciales d'**Ambatovaky**, d'**Analamazaotra**, de **Marotandrano**.